

ОБЕРЕЖНО, ДИФТЕРІЯ!



ДИФТЕРІЯ - це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, яке характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем.

Клінічна картина захворювання залежить від локалізації патологічного процесу, його поширеності, ступеня токсикозу та/або обтурації дихальних шляхів, наявності та характером ускладнень, супутніми захворюваннями та приєднанням вторинних інфекцій.

Захворювання на дифтерію може мати наступні прояви:

- ✓ біль у горлі,
- ✓ підвищена температура, лихоманка,
- ✓ набряк слизової оболонки ротоглотки,
- ✓ наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу,
- ✓ набряк шиї,
- ✓ збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

Ускладнення дифтерії:

- ✓ блокування дихальних шляхів,
- ✓ інфекційно-токсичний шок,
- ✓ пошкодження серцевого м'яза (міокардит),
- ✓ ураження нервової системи,
- ✓ нефрозонефрит,
- ✓ легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).

Профілактика

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень – **вакцинація** дітей, згідно з календарем профілактичних щеплень, і ревакцинація дорослих (кожні 10 років).



Вакцинація, як і перенесене захворювання, вже через 1-1,5 років не гарантує захист від інфікування та захворювання, але захворювання у правильно щеплених буде протікати набагато легше, ніж у тих, хто не має щеплень. Тому так важливо вчасно проводити як вакцинацію, так і ревакцинацію.

Для попередження розповсюдження захворювання потрібне раннє виявлення хворого, його ізоляція та лікування, а також виявлення та санація бактеріоносіїв.

Дітям роблять щеплення вакциною АКДП у 2, 4 та 6 місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація, згодом ревакцинацію проводять у 6 років вакциною АДП, наступну у 16 років — АДП-М.

Дорослі ж повинні ревакцинуватися (вакцинуватися повторно) кожні 10 років. Тобто якщо востаннє ви робили щеплення у 16, то першу ревакцинацію слід зробити в 26 років, другу - у 36 і так далі.

Якщо доросла людина або дитина старша 7 років раніше не вакцинувалися від дифтерії і правця, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М - спочатку перша доза, через місяць - друга, через 6 місяців після другої - третя.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Лише вакцинація рятує від дифтерії. 99% людей, що мають щеплення від дифтерії не хворіють.

Зробити щеплення від дифтерії можна безкоштовно для дорослих і дітей. Для того, щоб отримати вакцину, зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

ЗАХИСТИ СЕБЕ ВІД ДИФТЕРІЇ

